

ISTRUZIONI PREOPERATORIE PER CHIRURGIA ORALE

- Assumere gli antibiotici come prescritto (iniziare 24 o 2 ore prima dell' intervento)
- Evitare il fumo almeno 7 giorni prima dell' intervento
- Effettuare sciacqui con collutorio a base di clorexidina (Dentosan,Plak-out,etc.) 3 volte al giorno per 30 secondi a partire dalla settimana precedente l' intervento
- Arrivare all' intervento riposati, con indumenti comodi e struccati
- Se prescritti altri farmaci (ansiolitici, antiinfiammatori o spray nasali) assumerli come indicato senza "sconti"
- Leggere anche le istruzioni postoperatorie e per qualsiasi dubbio contattare lo studio

ISTRUZIONI POSTOPERATORIE PER CHIRURGIA ORALE

- Assumere tutti i farmaci nelle dosi e nei tempi prescritti
- Non sciacquare vigorosamente la bocca per le prime 24 ore dopo l' intervento
- Applicare impacchi di ghiaccio per almeno 3-4 ore dopo l' intervento (massimo 6-8 ore) ad intervalli di 20-30 minuti in corrispondenza della zona operata. L' edema o il gonfiore sono normali conseguenze di questi interventi.
- Per il controllo del dolore assumere l' antiinfiammatorio come prescritto per i primi 2-3 giorni, una certa dolenzia è un normale evento dopo questi interventi
- Un leggero sanguinamento nelle prime 24-48 ore è una normale conseguenza degli interventi implantari; nel caso è sufficiente la compressione con garza stretta tra le arcate per 15-30 minuti.
- Non fumare nei primi 7 giorni successivi all' intervento
- Evitare le bevande alcoliche per le prime 24 ore
- Evitare di ingerire cibi caldi per le prime 24 ore, cibi duri per almeno 3 giorni.
- Masticare il cibo dal lato opposto all' intervento per almeno 7-10 giorni
- Evitare lo spazzolamento nella zona dei punti di sutura fino alla rimozione dei punti. Spazzolare con regolarità gli altri denti. Dopo la rimozione dei punti è consigliabile l' uso di uno spazzolino per 2 settimane
- Non fare sforzi fisici nelle prime 12 ore. Si raccomanda di riposare con il capo leggermente sollevato usando 2 cuscini per le prime notti.
- E' normale un leggero aumento della mobilità dei denti dopo la chirurgia per alcune settimane.

PER QUALSIASI DUBBIO TELEFONATE ALLO STUDIO !

CONTATTARCI PRONTAMENTE IN CASO DI SANGUINAMENTO INTENSO, FORTE DOLORE DOPO IL TERZO GIORNO, REAZIONI ALLERGICHE E PERDITA DELLE SUTURE NEI PRIMI 3 GIORNI